

ЭРАЛЬФОН®

эпoэтин альфа

ЭРА НОВОЙ ЖИЗНИ!



ПРЕПАРАТ РЕКОМБИНАНТНОГО
ЭРИТРОПОЭТИНА ЧЕЛОВЕКА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ

ОНКОЛОГИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ



ЗАО «ФармФирма «Сотекс». 115201, Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 4, стр. 7
Тел.: +7 495 231-15-12. Факс: +7 495 231-1509; www.sotex.ru

Регистрационный номер: ЛСР-008793/10 от 20.12.2017. Информация для медицинских и фармацевтических работников.



ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПО ПОВОДУ АНЕМИИ¹

- Выявление и устранение таких причин как витаминная недостаточность, нарушения обмена веществ или хронические воспалительные заболевания, кровотечения и др.
- Оценка достаточности уровня железа в организме:
уровень ферритина в сыворотке крови ≥ 100 нг/мл, коэффициент насыщения трансферрина $\geq 20\%$

↓

РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ ЭРИТРОПОЗ-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ¹

- Следует начинать терапию препаратом Эральфон[®] при уровне Hb ≤ 10 г/дл.
- Дозу препарата Эральфон[®] корректируют индивидуально с целью достижения и поддержания целевого (12 г/дл) уровня Hb
- По результатам анализов при необходимости назначают препараты железа для нормализации эритропоэза

↓
40 000 МЕ п/к 1 р/нед²↓
150 МЕ/кг п/к 3 р/нед [12 000 МЕ]²**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ НЬ ДО СТАБИЛИЗАЦИИ²**

- Снижение дозы на 25-50 %, если: Hb увеличивается более чем на 2 г/дл в течение месяца или достигает уровня 12 г/дл
- Приостановка введения препарата при Hb более 13 г/дл и достижения уровня Hb менее 12 г/дл¹

↓
При применении 1 р/нед: оценка ответа
через 4 недели¹↓
При применении 3 р/нед: оценка ответа
через 4 недели¹

Если прирост Hb < 1 г/дл
и уровень Hb < 10 г/дл или
количество ретикулоцитов
увеличилось менее чем на
40 000 клеток/мкл выше
исходного количества²

- Дозу повышают
до 60 000 МЕ 1 р/нед
- Ответ на лечение регуляр-
но оценивают в соответст-
вии с инструкцией
по применению

Если прирост Hb ≥ 1 г/дл
или количество
ретикулоцитов
увеличилось более чем
на 40 000 клеток/мкл выше
исходного количества²

- Доза прежняя
- Ответ на лечение регуляр-
но оценивают в соответст-
вии с инструкцией
по применению

Если прирост Hb < 1 г/дл
и уровень Hb < 10 г/дл или
количество ретикулоцитов
увеличилось менее чем на
40 000 клеток/мкл выше
исходного количества²

- Дозу повышают
до 300 МЕ/кг 3 р/нед
- Ответ на лечение регуляр-
но оценивают в соответст-
вии с инструкцией
по применению

КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ²

Hb повышается менее чем
на 1 г/дл и количество
ретикулоцитов менее 40 000
клеток/мкл по сравнению
с исходным количеством

↓
Лечение прекратить

Продолжить лечение до
целевых значений Hb*

↓
Терапия должна
продолжаться в течение
1 мес после окончания
курса химиотерапии

Hb повышается менее чем
на 1 г/дл и количество
ретикулоцитов менее 40 000
клеток/мкл по сравнению
с исходным количеством

↓
Лечение прекратить

1. Практические рекомендации по лечению анемии при злокачественных новообразованиях. Коллектив авторов: Орлова Р.В., Гладков О.А., Жуков Н.В., Коноп М.В., Королева И.А., Ларионова В.Б., Моисеенко В.М., Поддубная И.В., Пушкин В.В. DOI: 10.18027 / 2224-5057-2021-10-3s2-36.
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эральфон[®]. ЛСР – 008793/10 от 02.07.2021,
Hb – гемоглобин, *120 г/л.